

Pediculose (PIOLHO)

ETIOLOGIA :

Pediculus humanus capitis = Piolho da Cabeça

Pediculus humanus corporis = Piolho do Corpo

EPIDEMIOLOGIA :

Os piolhos de cabeça ocorrem em todos os grupos sócio - econômicos; o comprimento do cabelo não influencia na infestação.

A transmissão ocorre por contato direto com indivíduos infestados, ou contato indireto com pertences dessas pessoas (pentes, escovas, travesseiros).

SINAIS e SINTOMAS :

Coceira intensa e escoriações.

DIAGNÓSTICO e TRATAMENTO :

Identificação de lêndias (ovos) e piolhos a olho nu. O tratamento deve ser feito com Toppyc loção em aplicação única.

MEDIDAS DE CONTROLE:

- Os contatos devem ser examinados e tratados se estiverem infestados. A diferenciação dos ovos dos cilindros capilares benignos (uma camada de células foliculares que facilmente se desprendem do folículo piloso) pode ser difícil. As pessoas que partilham a mesma cama devem ser tratadas profilaticamente.
- As roupas pessoais de cama ou brinquedos de pano podem ser desinfetados na máquina de lavar ou de secar (com os ciclos a quente), já que as temperaturas que excedem 53,5° C durante 5 minutos são letais aos piolhos e aos ovos. A lavagem a seco ou simplesmente guarda as roupas em sacos plásticos por cerca de 10 dias também é efetiva.
- Para desinfetar pentes e escovas, recomenda-se deixa-los em água quente por 10 minutos ou lavar com xampu pediculicida.